

DEUX
COCCINELLIDES NOUVEAUX
DU CONGO BELGE

PAR

le D^r A. SICARD

Chilocorus stillatus n. sp. — *Late ovatus; ruber, pubescens, Thorace nigro antice exigue rufo-limbato. Elytris nigris, pubescentibus, guttis tribus parvis rubris (I, I, I, collocatis) notatis.*

Longueur : 6^m5.

En ovale large, pubescent. Tête d'un jaune roux, à pubescence très courte, à ponctuation fine et peu dense; côtés du canthus largement arrondis, antennes et palpe roux, avec le dernier article des palpes maxillaires rembruni au sommet. Corselet noir, très finement rebordé de roux en avant et jusqu'au milieu des lobes antérieurs qui sont arrondis, base en ogive large, légèrement sinuée de chaque côté de la partie médiane; à pubescence courte, fournie, rousse, dirigée en avant; à ponctuation nette, bien marquée, non étoilée, peu dense sur le disque, plus serrée sur les bords. Écusson noir. Élytres à pubescence semblable à celle du corselet, dirigée en arrière; très convexes, à côtés tombant droit, non explanés; ponctuation semblable à celle du disque du corselet; noirs, avec trois petites taches d'un jaune rouge situées sur une ligne légèrement courbe partant des deux cinquièmes internes de la base pour rejoindre le septième postérieur de la suture : tache 1. petite, en ovale allongé, éloignée de la base d'une distance égale à la moitié de sa longueur située en dedans du calus huméral; tache 2, petite, à peu près carrée, à la même distance de la suture que la tache 1 et près de deux fois

plus éloignée du bord latéral, située à peu près au milieu de la longueur de l'élytre; tache 3, en triangle arrondi, petite, deux fois plus rapprochée de la suture que du bord latéral, environ au sixième de la longueur.

Dessous roux à pubescence jaunâtre; épipleures noires, impressionnées au niveau des genoux postérieurs; plaques abdominales concaves. Dent des tibias très accusée, aiguë et, surtout pour les postérieurs, légèrement recourbée en dedans

Pieds roux, comme le dessous du corps.

Un exemplaire Tanganyika (HECO). — Musée du Congo belge.

Bien reconnaissable à sa couleur et à la pubescence uniforme du dessus.

Caria Schoutedeni n. sp. — *Hemisphærica convexa, glabra, capite rufo, mandibulis nigris, antennis palpisque rufis; thorace nigro latera versus exigue rufo limbato; elytris rubris, lævibus, lateribus late irregulariterque nigris; subtus rufo-brunnea, epipleuris externe nigrolimbatis; pedibus rubris.*

Longueur : 8^{mm}5.

Presque hémisphérique, très convexe. Tête d'un roux brunâtre clair, glabre; à ponctuation fine et assez dense; mandibules noires, antennes et palpes roux. Corselet noir avec les angles antérieurs roux, à côtés légèrement sinués près du bord antérieur, finement rebordés et marqués en dedans du rebord d'une ligne enfoncée plus profonde postérieurement et qui n'atteint pas tout à fait la base; angles postérieurs arrondis, base en arc de cercle large, non sinuée, ponctuation fine, nette, médiocrement dense. Écusson noir. Élytres très convexes, presque imponctués, sauf sur les côtés à partir de l'angle huméral jusqu'à la suture où ils présentent des points enfoncés, peu serrés et devenant de plus en plus superficiels à mesure qu'on approche de la suture; d'un rouge cerise vif sur le disque avec une large bordure noire, cette bordure couvrant les deux cinquièmes externes de la base, rétrécie vers le quart de la longueur, puis progressivement élargie jusqu'à la suture dont elle couvre le cinquième postérieur. Dessous d'un roux brunâtre avec le bord externe des épipleures noir. Plaques abdominales touchant le bord postérieur de l'arceau, peu anguleuses, concaves en dehors. Pieds rougeâtres.

Région de Sassa (C^t COLMANT). — Musée du Congo belge.

J'ai dédié cette belle espèce à M. SCHOUTEDEN qui m'en a communiqué deux exemplaires.
